



SANTIAGO HERNÁNDEZ G.
OTORRINOLARINGÓLOGO OTÓLOGO

CIRUGÍA TUBOS DE VENTILACIÓN

La cirugía de colocación de tubos de ventilación en los oídos (timpanostomía con tubos de ventilación) es una cirugía que busca disminuir la frecuencia de infecciones en los oídos y la presencia de líquido en el mismo, mejorando la ventilación del oído y equilibrando las presiones. Busca también mejorar la pérdida de audición, el dolor de oído y las alteraciones del equilibrio en algunos pacientes.

Esta cirugía es un procedimiento de corta duración, bajo riesgo de complicaciones y poco invasiva, sin embargo, se deben seguir las siguientes recomendaciones para asegurar un adecuado postoperatorio.

Esta cirugía en general es muy poco dolorosa, en algunos casos es necesario dar unas pocas dosis de analgésico para controlar el dolor, según las dosis que le sean formuladas.

Los pacientes operados pueden reiniciar su actividad normal al día siguiente de la cirugía. La actividad física no hará que los tubos se salgan.

Los tubos se caen solos, duran en el tímpano aproximadamente 6 meses a un año y medio. Algunos pacientes expulsan los tubos antes de este tiempo y otros después, dependiendo de cada caso.

Sólo el 1% de las personas operados duran con los tubos más de 2 años, en cuyo caso es necesario hacer otro procedimiento para extraer el tubo. - Cuando el tubo es expulsado, la membrana timpánica cicatriza sin dejar secuelas evidentes solamente se observará según su cicatrización una pequeña marca. Sólo en 1 - 2% de los casos el tubo, al ser expulsado deja una pequeña perforación en la membrana timpánica que debe ser cerrada con otro procedimiento.

En la mayoría de los pacientes, sólo requieren un juego de tubos para disminuir la frecuencia de otitis. Sin embargo, en algunas ocasiones se requiere más de una cirugía para controlar completamente la recurrencia de la enfermedad.

En algunos casos los tubos permiten que la secreción que se mantenía acumulada en el oído sea expulsado por el oído. Esto se conoce como otorrea. Esto no significa que la cirugía haya salido mal, es esperable que algunos pacientes presenten otorrea en algún momento de su posoperatorio.

Si el paciente presenta otorrea (salida de material purulento) después de la cirugía debe consultar nuevamente, para iniciar el manejo médico; que usualmente se trata de gotas óticas y no requiere antibióticos orales. Estas gotas sólo deben ser formuladas por Santiago Hernández o su otorrinolaringólogo.

Los pacientes operados pueden bañarse en la ducha sin problema después de la cirugía. Se recomienda no sumergirse en el agua de piscinas, ríos, lagos, etc. - Se desaconseja el ingreso a baño turco.

Es normal después de esta cirugía, sentir el oído tapado.

Clínica de Marly Carrera 13 No. 49 - 40 Consultorio 323 Tel: (031) 2325375 Telefax: (031) 3383209 Conmutador: (031) 3436600 ext. 1385 / 1386 Bogotá - Colombia

Ante cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse al consultorio